

## VACCINAZIONI

Virus o batteri vivi attenuati (es. tifo con compresse, febbre gialla, morbillo, parotite).	4 settimane
Vaccinazione Epatite B Interventi chirurgici minori	una settimana
Vaccinazione contro rosalia, varicella-Zoster Tubercolosi, febbre gialla, morbillo, parotite, vaiolo, antipolio orale, tifo e paratifo	un mese
Vaccinazione antirabbica dopo esposizione (morso animale)	un anno
Per tutte le altre vaccinazioni (influenza, epatite A, papillomavirus, rabbia (senza morso animale) meningite C, asintomatico pertosse, febbre delle montagne rocciose, tetano, difterite, colera, peste, pneumococco poliometite, meningococco)	48 ore se il soggetto è asintomatico

## ALTRE ESCLUSIONI TEMPORANEE

Intervento chirurgico minore ambulatoriale -Day Surgery	una settimana
Cure	esclusione di 48 ore per: cure di minore entità da parte di dentista o odontoigienista (N.B. l'estrazione, la devitalizzazione ed interventi analoghi se non complicate da infezioni sono considerati interventi chirurgici minori

Assunzione di farmaci	5 giorni dopo l'assunzione di Aspirina, Aulin, antinfiammatori, antidolorifici
Terapie	Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo di medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura
Situazioni epidemiologiche particolari (es. focolai di malattie)	Esclusione conforme alla situazione epidemica
Allergie a farmaci con particolare riguardo alla penicillina	Rinvio di un anno dopo l'ultima esposizione

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un datore ai fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione

### **ESCLUSIONE TEMPORANEA**

In presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni il candidato donatori deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue e di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata

### **INFEZIONI:**

dopo malattia infettiva i donatori sono esclusi dalla donazione per almeno 2 settimane a decorrere dalla data della completa guarigione clinica. Si applicano tuttavia i seguenti periodo di esclusione per le infezioni indicate in tabella

Glomerulonefrite acuta	5 anni dalla completa guarigione
Brucellosi	2 anni dalla completa guarigione
Osteomielite	2 anni dalla completa guarigione

Febbre Q	2 anni dalla completa guarigione
Tubercolosi	2 anni dalla completa guarigione
Febbre reumatica	2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica
Toxoplasmosi, mononucleosi	6 mesi dopo la data di guarigione
Infettiva M. di Lyme (da morso di zecca)	
Epatite A (documentata)	
Infezioni da Citomegalovirus	
Puntura della zecca	3 mesi dalla guarigione
Febbre superiore a 38 C	2 settimana dopo la cessazione dei sintomi
Operazione ernia o menisco	4 mesi
Affezioni di tipo influenzale	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
Gravidanza	6 mesi dopo il parto
Interruzione gravidanza	6 mesi

Possono sussistere per motivi per i quali è necessario, ai fini della protezione della salute del candidato donatore, rinviare la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione

### **CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DEL CANDIDATO DONATORE AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA SUA SALUTE**

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue e di emocomponenti per la tutela della propria salute

Malattie autoimmuni	Ad esclusione della Malattia Celiaca purché il donatore segua una dieta priva di glutine
Malattie cardiovascolari	Donatori con affezioni cardiovascolari in atto o pregresse ad eccezione di anomalie congenite completamente curate
Malattie organiche di sistema nervoso centrale	Antecedenti di gravi malattie organiche e sistema nervoso

Neoplasie o malattie maligne	centrale Eccetto cancro in situazione di completa guarigione
Tendenza anomala dell'emorragia	candidati donatori con antecedenti coagulopatia congenita o acquisita importante
Crisi di svenimento e/o convulsione	Convulsioni diverse da quelle febbrili infantili ad eccezione di quelle per le quali sono trascorsi 3 anni dall'ultima terapia anticonvulsiva senza ricadute
Affezioni gastrointestinali epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche o respiratorie	i dati donatori con grave affezione attiva, cronica recidivante
Diabete Se in trattamento con insulina	
MALARIA: -individui che sono vissuti in zone malariche nei primi 5 anni vita o per 5 anni consecutivi della loro vita	Esclusione dalla donazione di sangue intero, emazie e piastrine per i 3 anni successivamente al ritorno dall'ultima visita in zona endemica a condizione che la persona resti asintomatica, E' ammessa la donazione di plasma da inviare al frazionamento industriali (*)
Individui con pregressa malaria	possono donare plasma da inviare al frazionamento industriale (*)
visitatori asintomatici di zone endemiche (anche con profilassi)	possono donare 6 mesi dopo il rientro
viaggi in zone endemiche per malattie tropicali	3 mesi dal rientro (valutare lo stato di salute del donatore dopo il rientro)
viaggi in zone dove esistano possibili focolai infettivi virali (es. SARS, influenzata aviaria ecc.)	4 settimane dal rientro

(\*) A condizione che siano adottate misure per escludere l'uso clinico del plasma

## ESPOSIZIONE A RISCHIO DI CONTRARRE UN'INFEZIONE TRASMISSIBILE CON IL SANGUE

-esami endoscopici con strumenti flessibili (colonscopia)-  
spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago - trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati - trapianto di tessuti o cellule di origine umana - tatuaggi o body piercing - agopuntura (se non seguita da professionisti qualificati e con ago usa e getta) - persone a rischio dovuto a stretto contatto domestico con persone affette da epatite B - rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive - rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da HBV, HCV, HIV - intervento chirurgico maggiore

4 mesi dall'ultima esposizione a rischio

## CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE

malattie infettive

epatite C- epatite B (eccetto persone divenute HBsAg negative e HBsAb positive) - HIV 1-2 - HTLV I/II babesiosi - lebbra - Kala Azar (leishmaniosi viscerale) - tripanosoma Cruzi (M di Chagas) - sifilide - epatite ad eziologia indeterminata

Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE)(per es. Morbo Creutzfeld-Jakob, nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jakob)

Persone con antecedenti medici o familiari che comportano un di rischio di contrarre TSE compresi donatori che hanno subito il trapianto della cornea e/o nella dura madre e/o che in passato sono stati curati con medicinali estratti da ghiandola Pituitaria umana - candidati donatori che hanno soggiornato nel periodo dal 1980 1996 per più di 6 mesi cumulativi nel Regno Unito - candidati donatori che hanno ricevuto trasfusioni allogeneiche nel Regno Unito dopo il 1960

Assunzione di sostanze farmacologiche

Ogni antecedente di uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via IM, EV o

tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di culturismo fisico

Riceventi xenotrapianti

Comportamento sessuale

Persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili

Alcolismo cronico